

Dátum:

Gyakorlatvezető:

Gyakorlat időpontja:

Név:

Neptunkód:

Tankör:

A csoport

ELMÉLET

- 2-dimenziós valószínűségi vektorváltozó fogalma.
- 2-dimenziós diszkrét valószínűségi vektorváltozó fogalma.
Mit értünk egy ilyen valószínűségi vektorváltozó értékein és együttes eloszlásán?
- Ismertesse a Chuchy-Bunyakovszij-Schwarz egyenlőtlenséget.
- Mikor mondjuk, hogy $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$ egy független minta?
- Ismertesse a Centrális Határeloszlás Tételt.

GYAKORLAT

A végeredményeket 4 tizedesjegyre kerekítve kérem!

1.-2. Legyen (ξ_1, ξ_2) egy kétdimenziós diszkrét valószínűségi változó, melynek az együttes eloszlását az alábbi táblázat tartalmazza:

(ξ_1, ξ_2)	1	3	5
2	0	$2p$	$3p$
4	$3p$	$2p$	0

Határozza meg a p paraméter és a $\mathbb{D}^2(2\xi_1 + 3\xi_2)$ értékét.

3. Legyen $\xi \sim \mathcal{N}(\mu = 2, \sigma^2)$, ahol σ^2 ismeretlen. Határozzuk meg a σ értékét, ha tudjuk, hogy a ξ valószínűségi változó az $(1.6; 2.4)$ intervallumba 0.85 valószínűséggel esik bele.

4. Legyen $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$ egy független minta $\text{Exp}(\lambda)$ eloszlásból. Adja meg a λ ismeretlen paraméter maximum likelihood becslését. Mi az ismeretlen λ paraméter becslése a momentumok módszerével.

5. Tekintsük az alábbi 6 elemű független mintát:

2.1, 6.3, 4.6, 6.4, 1.2, 3.5

Határozza meg a nevezetes statisztikákat, úgymint a mintaátlagot ($\bar{\xi}$), az empirikus szórásnégyzetet (s_n^2), a korigált empirikus szórásnégyzetet (s_n^{*2}), az empirikus mediánt ($\text{med}(\xi)$), és a medián abszolút eltérést ($\text{MAD}(\xi)$).

MEGOLDÁS

1.-2.

(ξ_1, ξ_2)	1	3	5
2	0	$2p$	$3p$
4	$3p$	$2p$	0

$2p + 3p + 3p + 2p = 10p = 1$, amiből kapjuk, hogy $p = 0.1$.

(ξ_1, ξ_2)	1	3	5	
2	0	0.2	0.3	0.5
4	0.3	0.2	0	0.5
	0.3	0.4	0.3	

ξ_1

x_i	2	4
p_i	0.5	0.5

$$\mathbb{E}(\xi_1) = 2 \cdot 0.5 + 4 \cdot 0.5 = 3$$

$$\mathbb{E}(\xi_1^2) = 2^2 \cdot 0.5 + 4^2 \cdot 0.5 = 10$$

$$\mathbb{D}^2(\xi_1) = \mathbb{E}(\xi_1^2) - (\mathbb{E}(\xi_1))^2 = 10 - 3^2 = 1$$

$$\mathbb{D}(\xi_1) = \sqrt{1} = 1.$$

ξ_2

y_j	1	3	5
p_j	0.3	0.4	0.3

$$\mathbb{E}(\xi_2) = 1 \cdot 0.3 + 3 \cdot 0.4 + 5 \cdot 0.3 = 3$$

$$\mathbb{E}(\xi_2^2) = 1^2 \cdot 0.3 + 3^2 \cdot 0.4 + 5^2 \cdot 0.3 = 11.4$$

$$\mathbb{D}^2(\xi_2) = \mathbb{E}(\xi_2^2) - (\mathbb{E}(\xi_2))^2 = 11.4 - 3^2 = 2.4$$

$$\mathbb{D}(\xi_2) = \sqrt{2.4} = 1.5492.$$

$$\mathbb{E}(\xi_1, \xi_2) = 2 \cdot 3 \cdot 0.2 + 2 \cdot 5 \cdot 0.3 + 4 \cdot 1 \cdot 0.3 + 4 \cdot 3 \cdot 0.2 = 7.8$$

$$\text{cov}(\xi_1, \xi_2) = \mathbb{E}(\xi_1 \xi_2) - \mathbb{E}(\xi_1)\mathbb{E}(\xi_2) = 7.8 - 3 \cdot 3 = -1.2$$

$$r(\xi_1, \xi_2) = \frac{\text{cov}(\xi_1, \xi_2)}{\mathbb{D}(\xi_1)\mathbb{D}(\xi_2)} = \frac{-1.2}{1 \cdot 1.5492} = -0.7746.$$

$$\begin{aligned} \mathbb{D}^2(2\xi_1 + 3\xi_2) &= \mathbb{D}^2(2\xi_1) + \mathbb{D}^2(3\xi_2) + 3\text{cov}(2\xi_1 + 3\xi_2) = 4\mathbb{D}^2(\xi_1) + 9\mathbb{D}^2(\xi_2) + 18\text{cov}(\xi_1, \xi_2) = \\ &= 4 \cdot 1 + 9 \cdot 2.4 + 18 \cdot (-1.2) = 4 \end{aligned}$$

3.

$$\begin{aligned} 0.85 &= \mathbb{P}(1.6 < \xi < 2.4) = \mathbb{P}\left(\frac{1.6 - 2}{\sigma} < \eta < \frac{1.6 - 2}{\sigma}\right) = \\ &= \mathbb{P}\left(\frac{-0.4}{\sigma} < \eta < \frac{0.4}{\sigma}\right) = \Phi\left(\frac{0.4}{\sigma}\right) - \Phi\left(-\frac{0.4}{\sigma}\right) = 2\Phi\left(\frac{0.4}{\sigma}\right) - 1 \end{aligned}$$

Így

$$\Phi\left(\frac{0.4}{\sigma}\right) = \frac{1.85}{2} = 0.925.$$

$$\frac{0.4}{\sigma} = 1.44, \quad \Rightarrow \quad \sigma = \frac{0.4}{1.44} = 0.2778.$$

4. $f(x, \lambda) = \lambda e^{-\lambda \xi_i} \Rightarrow L(\xi, \lambda) = \prod_{i=1}^n \lambda e^{-\lambda \xi_i}$

$$\frac{\partial}{\partial \lambda} l(\lambda) = \frac{\partial}{\partial \lambda} \ln \left(\prod_{i=1}^n \lambda e^{-\lambda \xi_i} \right) = 0$$

$$\frac{\partial}{\partial \lambda} \sum_{i=1}^n (\ln(\lambda) - \lambda \xi_i) = \sum_{i=1}^n \left(\frac{1}{\lambda} - \xi_i \right) = \frac{n}{\lambda} - \sum_{i=1}^n \xi_i = 0$$

Maximum-likelihood becslés:

$$\hat{\xi} = \frac{1}{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \xi_i} = \frac{1}{\bar{\xi}}$$

A momentumok módszerével

$$\mathbb{E}(\xi) = \frac{1}{\lambda} \quad \Rightarrow \quad \lambda = \frac{1}{\mathbb{E}(\xi)} \quad \Rightarrow \quad \frac{1}{\lambda} = \frac{1}{\bar{\xi}}$$

5.

$$\begin{aligned} \bar{\xi} &= \frac{1}{n} \sum \xi_i = \frac{2.1 + 6.3 + 4.6 + 6.4 + 1.2 + 3.5}{6} = 4.0167 \\ m_2 &= \frac{1}{n} \sum \xi_i^2 = \frac{2.1^2 + 6.3^2 + 4.6^2 + 6.4^2 + 1.2^2 + 3.5^2}{6} = 19.985 \\ s_n^2 &= m_2 - (\bar{\xi})^2 = 19.985 - 4.0167^2 = 3.8511 \\ s_n^{*2} &= \frac{n}{n-1} s_n^2 = \frac{6}{5} \cdot 3.8511 = 4.6213. \end{aligned}$$

A rendezett minta

1.2, 2.1, 3.5, 4.6, 6.3, 6.4

$$\text{med}(\xi) = \frac{3.5 + 4.6}{2} = 4.05$$

$$|1.2 - 4.05| = 2.85$$

$$|2.1 - 4.05| = 1.95$$

$$|3.5 - 4.05| = 0.55$$

$$|4.6 - 4.05| = 0.55$$

$$|6.3 - 4.05| = 2.25$$

$$|6.4 - 4.05| = 2.35$$

0.55, 0.55, 1.95, 2.25, 2.35, 2.85

$$\text{MAD}(\xi) = \frac{1.95 + 2.25}{2} = 2.1.$$