

Differencialegyenletek. I. Feladatsor

1. $x_0 = 9$, $x_{n+1} = \phi(x_n) = 5x_n + 8$. Mennyi x_n ?

ϕ fixpontja: $x_f = 5x_f + 8$, $\implies x_f = -2$. Fixpont koruli linearizalt dinamika:

$$\Delta x_n = x_n - x_f = x - (-2), \quad \Delta x_{n+1} = 5\Delta x_n,$$

tehát

$$x_n = 5^n \cdot (9 - (-2)) + (-2).$$

2. Ird at a kovetkezo DE-ket idofuggetlen DE rendszerre!

$$a) y' = xy^2 + x; \quad b) y' = x - y; \quad c) \frac{d}{dx} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} xy_1 + y_2 \\ y_1 y_2 + x \end{pmatrix}$$

Megoldas:

$$a) \frac{d}{dx} \begin{pmatrix} y \\ t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ty^2 + t \\ 1 \end{pmatrix}; \quad a) \frac{d}{dx} \begin{pmatrix} y \\ t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} t - y \\ 1 \end{pmatrix}; \quad c) \frac{d}{dx} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ty_1 + y_2 \\ y_1 y_2 + t \\ 1 \end{pmatrix}$$

;

3. Ird at a kovetkezo egyenleteket elsorende DE rendszerre!

$$a) y'' = -y' - 2y; \quad b) y''' = y + x; \quad c) \frac{d^2}{dx^2} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y'_1 - y_2 \\ y'_2 y_1 \end{pmatrix}$$

Megoldas:

$$a) \frac{d}{dx} \begin{pmatrix} y \\ v \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} v \\ -v - 2y \end{pmatrix}; \quad b) \frac{d}{dx} \begin{pmatrix} y \\ v \\ a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} v \\ a \\ y + x \end{pmatrix}; \quad c) \frac{d}{dx} \begin{pmatrix} y_1 \\ v_1 \\ y_2 \\ v_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_1 - y_2 \\ v_2 \\ v_2 y_1 \end{pmatrix}$$

4.

$$a) y' = f(x, y) = x - y; \quad b) y' = f(x, y) = y^2 + yx;$$

Mennyi y'' es y''' ? Ird fel y harmadrendu Talor polinomjat az $x = 0$ pont korul, ha $y(0) = 5$!

Megoldas:

$$y'' = \left(\frac{\partial}{\partial x} + f \frac{\partial}{\partial y} \right) f; \quad y''' = \left(\frac{\partial}{\partial x} + f \frac{\partial}{\partial y} \right)^2 f,$$

tehát

$$a) y'' = -x + y + 1, \quad y''' = x - y - 1, \\ y(0) = 5, \quad y'(0) = f(0, 5) = 0 - 5, \quad y''(0) = -0 + 5 + 1 = 6, \quad y'''(0) = 0 - 5 - 1 = -6,$$

$$y(x) \approx 5 - 5x + \frac{6}{2!}x^2 + \frac{-6}{3!}x^3$$

$$b) y'' = 2xy + 2y^3 + 1, \quad y''' = 2x^2 + 8xy^2 + 6y^4 + 2y, \\ y(0) = 5, \quad y'(0) = f(0, 5) = 25, \quad y''(0) = 251, \quad y'''(0) = 3760,$$

$$y(x) \approx 5 + 25x + \frac{251}{2!}x^2 + \frac{3760}{3!}x^3$$

5.

$$a) f(x) = \sin x, \quad x_0 = \pi/2; \quad b) f(x) = \sqrt{x}, \quad x_0 = 9; \quad c) f(x) = 1/x, \quad x_0 = 2;$$

Ird fel f -nek a linearis $f(x_0 + \Delta x) \approx T_1(x_0 + \Delta x)$ kozeliteset, ha $\Delta x = 0.1$! Mennyi $\max_{z \in [x_0, x_0 + \Delta x]} |f''(z)|$? Adj felso korlatot a kozelites $|\text{hiba}(\Delta x)| = |f(x_0 + \Delta x) - T_1(x_0 + \Delta x)|$ hibajara!

6. Alkalmazd az Euler, illetve a Heun módszert a következő DE-ekre $\Delta x = 0.1$ lépésközzel az $y(2) = 3$ kezdeti feltétel mellett!

$$a) y' = x - y; \quad b) y' = x - y^2;$$

Vegezd el ugyanezt az

$$c) \frac{d}{dx} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_2 \\ -y_1 \end{pmatrix}; \quad d) \frac{d}{dx} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_1 - y_2 \\ y_1^2 + x \end{pmatrix}$$

egyenletekre az $\begin{pmatrix} y_1(2) \\ y_2(2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$ kezdeti feltétel mellett!

Mit jósolnak ezek a módszerek $y(2.1)$ -re?

7. Rajzold le az $y' = f(y)$ DE iránymezojét és a megoldásgörbeit! Keresd meg a DE fixpontjait és írd fel a fixponttól való eltérésre vonatkozó DE linearizált alakját! Vizsgald meg a fixpontok stabilitását!

$$a) y' = 1, \quad b) y' = y, \quad c) y' = -y, \quad d) y' = y + 1, \\ e) y' = 1 - y^2, \quad f) y' = y(5 - y), \quad g) y' = y(1 - y)(1 + y).$$

8. Keresd meg az A matrix sajátértékeit és sajátvektorait! Írd fel a v vektort a sajátvektorok lineáris kombinációjaként! Mennyi $A^{13}v$?

$$a) (5) \quad b) \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \quad c) \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \quad d) \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \quad e) \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \quad f) \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} \\ g) \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 7 \end{pmatrix} \quad h) \begin{pmatrix} 2 & -3 & 0 \\ 3 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 7 \end{pmatrix}$$

Itt a v vektor értéke:

$$a) v = (8); \quad b - f) v = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}; \quad g - h) v = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

9. Oldd meg az előző feladatban szereplő A matrixokra az

$$\frac{d}{dx}y = Ay, \quad y(0) = v$$

DE-t! Írd fel az általános, illetve a partikuláris megoldást! Vizsgald meg az $y = 0$ fixpont stabilitását! Mennyi $\exp(xA)$? Írd fel a partikuláris megoldást e^{xA} segítségével!

10. Keresd meg az A matrix sajátértékeit és sajátvektorait!

$$a) \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad b) \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \quad c) \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \quad d) \begin{pmatrix} 7 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Mennyi $\exp(xA)$?

11. Oldd meg az előző feladatban szereplő A matrixokra az

$$\frac{d}{dx}y = Ay, \quad y(0) = v$$

DE-t! Írd fel a partikuláris megoldást e^{xA} segítségével, ha a v vektor értéke:

$$a - c) v = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}; \quad d) v = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

12. $y'' = y - y^3$. Legyen $p = y'$. Mutasd meg, hogy a DE a következő (Hamilton fele) alakban is felírható:

$$y' = \frac{\partial H}{\partial p}, \quad p' = -\frac{\partial H}{\partial y}.$$

Mennyi H ? Mutasd meg, hogy $H' = 0$!

Írd at a DE-t egy elsőrendű DE rendszerre, keresd meg annak a fixpontjait, írd fel a fixpontoktól való eltérésre vonatkozó linearizált DE-ket!

13. $y'' = y - y^3 - y'$. Legyen $p = y'$ Ird at a DE-t egy elsorendu DE rendszerre, keresd meg annak a fixpontjait, ird fel a fixpontoktól valo elterésre vonatkozó linearizált DE-eket!

14.

$$\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_1 - y_1 y_2 \\ -y_2 + 2y_1 y_2 \end{pmatrix}, \quad \frac{d}{dt} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (y_1 - 3)(y_2 - 4) \\ (y_1 - 2)(y_2 - 5) \end{pmatrix}$$

Keresd meg a DE-k fixpontjait, ird fel a fixpontoktól valo elterésre vonatkozó linearizált DE-eket!

15. Ird fel a következő Lagrange függvényekhez tartozó Euler-Lagrange egyenlet(ek)et!

$$\begin{aligned} (y')^2 - y^2, \quad y' + 8, \quad (y')^2 + y', \quad L = (y')^4 + (y - 1)^2, \\ M = ((y'_1)^2 + (y'_2)^2) / 2 - V(y_1, y_2), \\ ((y'_1)^2 + (y'_2)^2) / 2 + A_1(y_1, y_2)y'_1 + A_2(y_1, y_2)y'_2 \end{aligned}$$

Megoldas:

L:

$$\begin{aligned} \frac{\partial L}{\partial y} = 2(y - 1), \quad \frac{\partial L}{\partial y'} = 4(y')^3, \\ \frac{d}{dx} (4(y')^3) - 2(y - 1) = 0. \end{aligned}$$

M:

$$\begin{aligned} \frac{\partial M}{\partial y'_1} = y'_1, \quad \frac{\partial M}{\partial y'_2} = y'_2, \quad \frac{\partial M}{\partial y_1} = -\frac{\partial V}{\partial y_1}, \quad \frac{\partial M}{\partial y_2} = -\frac{\partial V}{\partial y_2}, \\ \frac{d}{dx} y'_1 - \left(-\frac{\partial V}{\partial y_1}\right) = 0, \quad \frac{d}{dx} y'_2 - \left(-\frac{\partial V}{\partial y_2}\right) = 0, \\ \text{vagy} \\ y''_1 = -\frac{\partial V}{\partial y_1}, \quad y''_2 = -\frac{\partial V}{\partial y_2} \end{aligned}$$

16. Legyen adott az $S[u] = \int_0^1 (y'(x))^4 + xy(x) dx$ funkcionál a $[0, 1]$ -en értelmezett és a végpontokban eltűnő függvények H tere. Legyen V a $[0, 1]$ -en értelmezett, a végpontokban eltűnő és a $[0, 1/3]$, $[1/3, 2/3]$, $[2/3, 1]$ intervallumokon affin folytonos függvények tere. Legyen ϕ_1 és ϕ_2 ennek a terek egy bazisa, ahol $\phi_1(1/3) = \phi_2(2/3) = 1$ és $\phi_2(1/3) = \phi_1(2/3) = 0$. Legyen $u_h = c_1\phi_1 + c_2\phi_2$. Számítsd ki az $S[u_h] = s(c_1, c_2)$ kétváltozós függvényt! (Az $xy(x)$ -os tag kiszámítására az integrálban használj valamilyen közelítő módszert!)

Megoldas:

ϕ_1 deriváltjának az értéke a $[0, 1/3]$, $[1/3, 2/3]$, $[2/3, 1]$ intervallumokon: $3, -3, 0$.

ϕ_2 deriváltjának az értéke a $[0, 1/3]$, $[1/3, 2/3]$, $[2/3, 1]$ intervallumokon: $0, 3, -3$.

Tehát $\int_0^1 (y'(x))^4 dx = ((c_1 \cdot 3)^4 + ((c_2 - c_1) \cdot 3)^4 + (c_2 \cdot 3)^4) \cdot \frac{1}{3}$.

Az $xy(x)$ -es tag hozzájárulásának közelítő kiszámítása trapez módszerrel:

$\int_0^1 xy(x) dx \approx (0.5(0 \cdot 0 + 1/3 \cdot c_1) + 0.5(1/3 \cdot c_1 + 2/3 \cdot c_2) + 0.5(2/3 \cdot c_2 + 1 \cdot 0)) \cdot \frac{1}{3}$.

$S[u_h] = s(c_1, c_2)$ (közelítőleg) ezen tagok összege.